



Patienteninformation

Amiodaron

Amiodaron ist ein wirksames und heutzutage häufig eingesetztes Antiarrhythmikum. Speziell beim Vorhofflimmern, der häufigsten Herzrhythmusstörung, wird es verordnet. Amiodaron ist ein hochwirksames, aber auch ein nebenwirkungsreiches Antiarrhythmikum. Sein Einsatz sollte wohl bedacht sein und seine Anwendung verlangt ständiger Aufmerksamkeit der behandelnden Ärzte und auch der Patienten selbst. Amiodaron wird nur sehr langsam (über einen Zeitraum von mehreren Monaten) aus dem Körper ausgeschieden. Neben denen im Beipackzettel des Medikamentes erwähnten Informationen müssen einige besonders zu beachtende Nebenwirkungen genannt werden:

Auge

Hornhautablagerungen ohne Beeinträchtigung des Sehvermögens. Etwa 10% der Patienten beschreiben Störungen des Farbsehens, eine Sonnenbrille wird empfohlen, ggf. augenärztliche Kontrolle. Ablagerungen bilden sich nach Absetzen des Medikaments innerhalb von 3-7 Monaten zurück.

Haut

Lichtempfindlichkeit und Sonnenbrandgefahr, selten tritt eine schiefergraue Hautverfärbung auf, Schutz durch Meidung direkter Sonnenbestrahlung, Sonnenmilch mit hohem Lichtschutzfaktor und Verzicht auf Sonnenbäder/ Solarium.

Herz

Herzrhythmusstörungen, sehr selten der plötzliche Herztod, langsamer Puls.

Leber

Leberwerterhöhung auf das Zwei- bis Dreifache des Normwertes, meist harmlos und nur vorübergehend. Bei anhaltender deutlicher Erhöhung sollte das Medikament nach Rücksprache mit dem Arzt abgesetzt werden.

Lunge

In etwa 1% der Fälle kann es zu einer Lungenerkrankung kommen. Anzeichen sind oftmals Husten, Luftnot, Fieber und ein verschlechtertes Allgemeinbefinden. Arzt aufsuchen! Veränderungen sind meist rückbildungsfähig.

Schilddrüse

Behandlungsbedürftige Schilddrüsenüberfunktion, in extremen Einzelfällen ist eine operative Entfernung der Schilddrüse erforderlich.

Kontrollen

EKG vor Behandlungsbeginn und mindestens jährlich, Leberwerte zu Beginn und alle 3-6 Monate, Schilddrüsenparameter zu Beginn und alle 3-6 Monate, Lungenfunktion zu Beginn und bei Beschwerden, Röntgen-Thorax zu Beginn und alle 12 Monate, Augenärztliche Untersuchung zu Beginn und bei Beschwerden. (AMB 2007, 41, 45b)



Patienteninformation

Amiodaron

Eine Behandlung mit Amiodaron ist speziell aufklärungspflichtig. Risiken und mögliche Komplikationen werden mit dem Arzt ausführlich besprochen.

Diese Information ersetzt nicht den Beipackzettel und das ärztliche Aufklärungsgespräch.

Datum

Unterschrift des Patienten

Unterschrift des Arztes